

# Paracetamol B. Braun

## 10 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

### Indikasjoner:




- Kortvarig behandling av moderate smerter, særlig etter kirurgi
- Kortvarig behandling av feber

Intravenøs administrasjon er klinisk begrunnet ved et akutt behov for å behandle smerte eller hypertermi og/eller når andre administrasjonsveier ikke er mulig.

**Advarsel: Det er særlig risiko for overdosering med paracetamol 10 mg/ml infusjonsvæske hos barn på grunn av administrasjonsfeil.**

1 ml oppløsning inneholder 10 mg paracetamol. Dosen som skal administreres er avhengig av pasientens vekt. Avhengig av barnets vekt kan volumet som administreres være veldig lite. Ampullen på 10 ml er spesielt tilpasset nyfødte født på termin, spedbarn og småbarn som veier opptil 10 kg.

### Doseringstabell

	Nyfødte, spedbarn og barn ≤ 10 kg	Barn > 10 kg og ≤ 33 kg	Barn, ungdom og voksne > 33 kg og ≤ 50 kg	Ungdom og voksne > 50 kg og ingen ytterligere risikofaktorer for levertoksitet	Ungdom og voksne > 50 kg med ytterligere risikofaktorer for levertoksitet
Dose	7,5 mg/kg dvs. 0,75 ml/kg	15 mg/kg dvs. 1,5 ml/kg	15 mg/kg dvs. 1,5 ml/kg	1000 mg dvs. 1 Ecoflac® plus 100 ml	1000 mg dvs. 1 Ecoflac® plus 100 ml
	7,5 mg/kg gis høyst 4 ganger daglig	15 mg/kg gis høyst 4 ganger daglig	15 mg/kg gis høyst 4 ganger daglig	1000 mg gis høyst 4 ganger daglig	750 mg gis høyst 4 ganger daglig
Min. intervall	Minimumsintervall mellom hver administrering: 4 timer				
Maks. per 24 t	30 mg/kg (uten å overskride 300 mg)	60 mg/kg (uten å overskride 2000 mg)	60 mg/kg (uten å overskride 3000 mg)	4000 mg	3000 mg
Beholder	10 ml Mini-Plasco®: for pasienter ≤ 10 kg 	50 ml Ecoflac® plus: for pasienter > 10 kg til ≤ 33 kg 		100 ml Ecoflac® plus: for pasienter > 33 kg 	

### Eksempel (opptil 10 kg)

Vekt	Dose som skal administreres opptil 4 ganger daglig		Maks. dose per 24 timer	
2 kg	15 mg	1,5 ml	60 mg	6 ml
4 kg	30 mg	3,0 ml	120 mg	12 ml
6 kg	45 mg	4,5 ml	180 mg	18 ml
8 kg	60 mg	6,0 ml	240 mg	24 ml
10 kg	75 mg	7,5 ml	300 mg	30 ml

- Hos barn med lav kroppsvekt kan Paracetamol B. Braun fortynnes opptil 10 ganger i 9 mg/ml natriumkloridoppløsning eller 50 mg/ml glukoseoppløsning eller i en kombinasjon av disse to
- Spesielt mot slutten av infusjonen er det nødvendig med nøye monitorering for å unngå luftemboli

### Holdbarhet:

- Uåpnet: 2 år.
- Etter anbrudd: Infusjonen bør starte umiddelbart etter at beholderen er koblet til infusjonssettet.
- Etter fortytning: Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk (inkludert infusjonstid) for tillatte fortytninger er vist i 48 timer ved 23 °C. Av mikrobiologiske årsaker bør preparatet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstiden under bruk og forholdene før bruk.

Detaljert informasjon er også tilgjengelig i godkjent preparatomtale. Et helsepersonellbrev med sikkerhetsdata er tilgjengelig på [www.legemiddelverket.no](http://www.legemiddelverket.no).

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE