



FOR KIRURGISKE
INNGREP MED
VARIGHET INNTIL
90 MINUTTER¹

TAKIPRIL[®] 20 MG/ML

INJEKSJONSVÆSKE,
OPPLØSNING TIL SPINALT BRUK

Takipril injeksjonsvæske, oppløsning 20 mg/ml (prilokain) B. Braun

Indikasjon: Indisert til voksne for spinalanestesi ved kortvarige kirurgiske inngrep.

Dosering: Kun til bruk på sykehus. Dosering tilpasses individuelt. Fysisk tilstand og samtidig bruk av andre legemidler må tas med i vurderingen. Lavest mulig dose bør velges, se SPC pkt. 4.2. Effektvarigheten er doseavhengig. *Spesielle pasientgrupper:* Redusert dose anbefales ved nedsatt allmenntilstand, samtidige sykdommer (f.eks. vaskulær okklusjon, arteriosklerose, diabetisk polyneuropati), nedsatt lever- eller nyrefunksjon. *Administrering:* Kun til spinalanestesi. Ikke anbefalt til epiduralanestesi.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:

Kontraindikasjoner: overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre lokalanestetika av amidtypen, alvorlige problemer med myokardial ledningsevne, alvorlig anemi, dekomponert hjersteinsuffisiens, kardiogent og hypovolemisk sjokk, medfødt eller ervervet methemoglobinemi, samtidig behandling med anti-koagulanter, generelle og spesifikke kontraindikasjoner mht. teknikken ved subaraknoidal anestesi, bruk hos barn <6 måneder, intravaskulær injeksjon. Skal ikke injiseres i infiserte områder.

Skal kun gis av (eller under tilsyn av) spesialisert medisinsk personell med nødvendig kunnskap og erfaring. Ved tegn på akutt systemisk toksisitet eller total spinalblokkade må injeksjonen stoppes umiddelbart.

Særlig tilsyn kreves ved fullstendig eller delvis hjerte-blokk, høygradig hjertedekompensasjon, fremskreden lever- eller nyreskade, nedsatt allmenntilstand, akutt porfyri og hos eldre. Nøye vurdering av nytte/risikoforholdet ved nevrologiske forstyrrelser.

Komplikasjoner som kan oppstå: fall i arterielt trykk (økt risiko hos eldre), høy eller total spinalblokkade med påfølgende kardiovaskulær og respiratorisk depresjon (økt risiko hos eldre og sent i svangerskapet), nevrologisk skade.

Interaksjoner: Kan potensere dannelsen av met-

hemoglobin sammen med legemidler som inducerer methemoglobin. Økt risiko for bivirkninger ved samtidig bruk av andre lokalanestetika/legemidler med lignende kjemisk struktur. Forsiktighet må utvises ved bruk sammen med antiarytmika klasse III. Kombinasjon av ulike lokalanestetika inducerer tilleggseffekter som påvirker det kardiovaskulære- og sentralnervesystemet.

Graviditet/amming: Skal kun gis under graviditet dersom det er strengt nødvendig. Bruk til paracervikal blokkade eller pudendal anestesi bør unngås. Dersom administrering er nødvendig under amming, kan amming gjenoptas ca. 24 timer etter behandlingen.

Bivirkninger: *Svært vanlige ($\geq 1/10$):* Hypotensjon, kvalme. *Vanlige ($\geq 1/100$ til $< 1/10$):* Parestesi, svimmelhet, oppkast. *Alvorlige bivirkninger:* Skyldes signifikant overdosering og/eller utilsiktet injeksjon inn i en blodåre. Manifesteres ved symptomer som påvirker sentralnervesystemet (rastløshet, taleproblemer, desorientering, svimmelhet, muskelkontraksjoner, kramper, oppkast, bevisstløshet, respirasjonsstans, mydriasis) og det kardiosirkulatoriske system (økt arterielt trykk og puls, arytmi, redusert arterielt trykk, asystole). Etter hemming/blokkade av det myokardiale ledningssystemet kan i tillegg hjerterefrekvensen reduseres og myokarddepresjon oppstå. Methemoglobinemi og anafylaktisk reaksjon er sett.

Overdosering: Ved utilsiktet i.v. administrering vil toksisk effekt oppstå i løpet av 1-3 minutter. Ved overdosering vil maks. plasmanivåer oppnås først etter 20-30 minutter, avhengig av injeksjonssted, og inntreden av tegn på toksiske effekter vil være forsinket.

Pakninger, pris og reseptgruppe:

Pakninger og pris (AUP): 10 x 5 ml ampuller: kr 977,70. Egen prisavtale inngått med Sykehusinnkjøp HF (LIS 2001c Parenterale farmasøytiske spesialpreparater) for perioden 01.02.2020-31.01.2022).

Reseptgruppe: C.

For utfyllende informasjon om dosering, interaksjoner, advarsler/forsiktighetsregler, overdosering og bivirkninger, se Takipril SPC, godkjent 19.02.2020.